ᓄᓇᕕᒃ ᐊᓄᕋᓕᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ
RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK
NUNAVIK REGIONAL BOARD OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 AU NUNAVIK

EN TOUT TEMPS, LES DIRECTIVES CONTENUES DANS LE PIQ PRÉVALENT SUR CE DOCUMENT ET DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉES.

OFFRE VACCINALE DE BASE

- La prise de rendez-vous doit être offerte pour vaccination **chaque jeudi**.
- Une fiole pourra être ouverte dès que **des rendez-vous sont cédulés pour au moins 50% des doses** (5 (fiole 10 doses) ou 7 RV (fiole 14 doses) pour Moderna / 3 RV pour Pfizer). Les autres doses doivent être offertes en **sans rendez-vous**.
- Si le nbr de RV cédulés est **inférieur à 50% des doses d'une fiole,** la vaccination sera reportée à la semaine suivante. Elle devra alors avoir lieu **peu importe le nbr de RV donnés**, de manière à ce que la durée d'attente pour être vacciné soit toujours **de 2 semaines ou moins**.
- Les initiatives de vaccination hors CLSC sont permises **sous autorisation de la DSP**.
- Les séances de vaccination 100% sans RV sont permises (svp, informer la DSP de la tenue d'une telle activité).

INDICATIONS DE VACCINATION

	VACCIN MODERNA	VACCIN PFIZER
Indications de vaccination :	**Vacciner les personnes de 18 ans et plus**	**Vacciner les personnes de 12 à 17 ans**
	Personnes vaccinées à l'extérieur du Canada : voir le PIQ pour indications.	
Intervalles entre doses :	• **RECOMMANDÉ :** 4 semaines et plus / **MINIMAL :** 21 jours • **Personnes fortement immunodéprimées ou dialysées :** Voir *PIQ* • **Calendrier mixte avec vaccin à vecteur viral :** Voir *PIQ*	
Contre-indications : précautions :	**Contre-indications :** Anaphylaxie suivant l'administration d'une dose antérieure du même vaccin ou produit ayant un composant identique. **Précautions:** Voir le *PIQ*	
Intervalles à respecter entre les vaccins:	• **Ne pas administrer en même temps** que d'autres vaccins. • Peut être administré **14 jours avant ou après l'administration d'un autre vaccin inactivé ou vivant atténué**. • Un délai de **4 semaines** entre un vaccin à ARNm et un **TCT** est recommandé. Si indication clinique de TCT: voir *PIQ* pour indications. **Il n'y a PAS d'intervalle à respecter entre un vaccin ARNm et :** • Un vaccin en **prophylaxie postexposition** (ex : vaccins rage, tétanos, hépatite B). • Un vaccin dcaT chez une femme enceinte pour lui permettre d'être vaccinée à 32 semaines ou moins de sa grossesse.	

VACCINATION ET COVID-19

- Attendre **la fin** de **l'épisode aigu de COVID-19** ou d'un **isolement.**
- **Voyageurs: Attendre la fin de quarantaine avant administration.**
- **Personnes ayant des antécédents de COVID-19:**
  - Respecter un intervalle recommandé de 4 semaines ou plus après l'infection avant administration d'un vaccin ARNm (intervalle minimal de 21 jours).
  - Appliquer le **calendrier à 1 dose** selon l'algorithme « *Aide à la décision sur le nombre de doses de vaccin contre la COVID-19 à administrer aux personnes ayant déjà eu la maladie* » du PIQ . La personne peut faire le choix de recevoir sa 2ième dose indépendamment de ses antécédents de COVID-19.

CONSERVATION, PRÉPARATION & ADMINISTRATION

Tout transport vers un autre site doit être autorisé par la DSP (vanessa.drolet.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca).

Pour toute vaccination hors CLSC, voir le « *Protocole de vaccination hors CLSC* » sur la BAO.

	VACCIN MODERNA	VACCIN PFIZER
Temps de conservation: Toujours monitorer les températures d'entreposage minimalement 2x / jour (actuelle, minimale et maximale). Toujours protéger de la lumière. Une fois décongelé, ne pas recongeler.	• **Congelés entre -15 et -25°C : jusqu'à péremption de la fiole.** • **Réfrigérés entre 2 et 8°C (fiole non-perforée) : 30 jours.** • **Une fois la fiole perforée :** jusqu'à 24 heures entre 2-8°C.	• **Congelés entre -15 et -25°C :** **2** semaines maximum. • **Réfrigérés entre 2 et 8°C (non-perforée): 31 jours.** • **Une fois la fiole perforée :** jusqu'à 6 heures entre 2-8°C. • **Diluant:** Conserver entre 2 et 8°C ou à température ambiante. Ne pas congeler.
Présentation et posologie :	• **Posologie : 0,5ml IM** • **Nbr de doses :** 2 doses (excepté personnes avec atcd de COVID ou pour répondre à des exigences douanières si voyage – voir PIQ).	• **Posologie : 0,3ml IM** • **Nbr de doses :** 2 doses (excepté personnes avec atcd de COVID 19 ou pour répondre à des exigences douanières si voyage – voir PIQ**)**
Préparation :	• **Fioles multidoses de 5 ml ou de 8 ml- 10 doses/fiole ou 14 doses/fiole** • **Dilution requise? Non** • **Matériel :** standard ou à faible volume mort pour les fioles de 8ml • **Décongélation :** 2h30 au réfrigérateur (2 à 8°C) pour la fiole de 5ml; 3h pour la fiole de 8 ml au réfrigérateur (2 à 8°C); ou 1h à T° ambiante.	• **Fioles multidoses de 2 ml - 6 doses/fiole** • **Dilution requise? Oui** • **Matériel :** faible volume mort • **Décongélation :** 2-3 heures au réfrigérateur (2 à 8°C) ou 30 minutes à T °ambiante. • **Reconstitution :** avec 1,8 ml de diluant fourni. Jeter le diluant non utilisé.
Administration : *Se référer au PIQ pour modalités d'administration.*	• **Interchangeabilité :** Les personnes ayant reçu une 1ère dose de vaccins ARNm devraient se voir proposer **le même vaccin pour la 2ième dose**. Si non-disponible, opter pour le vaccin ARNm disponible.	

SAISIE SI-PMI, INVENTAIRES, RAPPORTS DE VACCINATION ET GESTION DES PERTES

• **Saisie Si-Pmi :** La saisie des vaccins administrés doit être complétée avant 22h le jour de l'administration.

• **Inventaires :**

- Un inventaire est requis **pour chaque journée de vaccination ou livraison de doses**, de même que chaque journée ou des **doses doivent être jetées (expiration d'une fiole).** Transmettre **le jour même à la pharmacie**.
- Un inventaire réel doit être réalisé et transmis à votre **conseiller en vaccination chaque vendredi**.

• **Rapports de vaccination :** Doivent être dûment remplis et transmis **à votre conseiller en vaccination chaque vendredi**.

• **Gestion des pertes :** Toute perte doit être signalée à votre conseiller en vaccination et à la pharmacie. Les fioles entamées ou non-entamées périmées doivent être retournées au DDR lorsque contiennent des doses perdues.

MANIFESTATIONS CLINIQUES INHABITUELLES (MCI)

Déclarer les MCI temporellement liées à la vaccination et pour laquelle on soupçonne un lien avec le vaccin en utilisant le **formulaire AH-728.** FAIRE PARVENIR à **vanessa.drolet.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca**

EN CAS DE MCI SÉVÈRES SURVENANT HORS DES HEURES D'OUVERTURE DE LA RRSSSN (9-17h) : aviser le médecin de garde de la DSP au 1-855- 964-2244 (sans frais).

POUR TOUTE QUESTION SUR LA VACCINATION COVID-19, S'ADRESSER AUX PERSONNES RESSOURCES EN VACCINATION POUR VOTRE CENTRE DE SANTÉ.