

	MODERNA	PFIZER 30 µg	PFIZER PÉDIATRIQUE 10 µg
Indications de vaccination :	Personnes de 12 ans et plus <i>(privilégier Pfizer pour les 12-29 ans)</i>	Personnes de 12 ans et plus <i>(choix préférentiel pour les 12 à 29 ans)</i>	Enfants de 5 à 11 ans
Nombre de doses :	2 doses en série primaire (Clientèles particulières : voir tableau suivant) 1 dose de rappel pour les personnes de 18 ans et plus		
Intervalles* : *Clientèles particulières: voir tableau suivant.	Recommandé : 4 semaines et plus (recommandation régionale) Minimal : 21 jrs Doses de rappel : 6 mois ou plus après dernière dose (minimal : 6 mois)		Recommandé : 8 semaines d'intervalle <u>et plus</u> Minimal : 21 jours
Présentation du produit :	FiOLE multidoses de 5 ml (10 doses) et de 8 ml (14 doses)	FiOLE multidoses de 2 ml (6 doses) Bouchon mauve	FiOLE multidoses de 2 ml (10 doses) Bouchon orangé
Expiration:	Date sur la fiole = date d'expiration.	Date d'expiration prolongée (valider avec conseiller, pharmacie ou SiPMi avant de jeter).	Ajouter 6 mois à la date de fabrication inscrite sur la fiole.
Durée de conservation : *Une fois décongelé, ne pas recongeler.	<ul style="list-style-type: none"> • JAMAIS entre -90 et -60°C. • -25 et -15°C : jusqu'à péremption. • 2 et 8°C (non-perforée) : 30 jrs. • FiOLE perforée : ad 24 heures (2-8°). 	<ul style="list-style-type: none"> • -90 et -60°C : jusqu'à péremption. • -25 et -15°C : 2 semaines. • 2 et 8°C (Non reconstitué) : 31 jrs. • FiOLE perforée : ad 6 heures (2-8°C). Diluant: entre 2 et 8°C ou T° ambiante.	<ul style="list-style-type: none"> • -90 et -60°C : jusqu'à péremption. • 2 et 8°C (Non-reconstitué) : 10 semaines. • JAMAIS entre -25 et -15°C. • FiOLE perforée : ad 12 heures (2-8°C). Diluant : entre 2-8°C ou T° ambiante.
Préparation :	Décongélation : <ul style="list-style-type: none"> • 2h30 (fiOLE de 5ml) ou 3h (fiOLE de 8 ml) entre 2 à 8°C • ou 1h à T° ambiante. 	Décongélation : 2-3 heures entre 2 à 8°C ou 30 minutes à T° ambiante. Reconstitution : avec 1,8 ml de diluant fourni. Jeter le diluant non utilisé. Matériel : à faible espace mort.	Décongélation : 4 heures entre 2-8°C ou 30 minutes à T° ambiante. Reconstitution : avec 1,3 ml de diluant fourni. Jeter le diluant non utilisé. Matériel : à faible espace mort.
Administration :	Posologie : 0,5 ml Dose de rappel : 0,25ml	Posologie : 0,3 ml Dose de rappel : 0,3 ml	Posologie : 0,2 ml

CLIENTÈLES PARTICULIÈRES et DOSES DE RAPPEL

	Personnes immunodéprimées ou dialysées	Toute personnes de 18 ans et plus résidant au Nunavik + femmes enceintes et Tds	Personnes avec antécédent de COVID-19 confirmé par TAAN
Nombre de doses :	<ul style="list-style-type: none"> • 3 doses (12 ans et plus) • Doivent recevoir 3 doses en primovaccination, peu importe les antécédents de COVID-19. • + 1 dose de rappel pour les 18 ans et plus • 2 doses (5 à 11 ans) 	2 doses + 1 dose de rappel	<ul style="list-style-type: none"> • 1^{ère} dose reçue 21 jours ou plus après le test positif: 1 dose + 1 dose de rappel. • 1^{ère} dose reçue dans les 20 jours suivant le test positif OU avant l'épisode de COVID-19 : 2 doses (aucune dose de rappel nécessaire).
Intervalle recommandé:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 semaines entre la 1^{ère} et 2^{ème} dose (minimal 21 jours); • 4 semaines et plus entre la 2^{ème} et 3^{ème} dose (minimal 4 semaines) • Dose de rappel : 3 mois ou plus 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 semaines et plus entre la 1^{ère} et 2^{ème} dose (recommandation régionale). • 3 mois entre la 2^{ème} dose et la dose de rappel 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 semaines ou plus après début des symptômes ou date du test positif si asymptomatique (intervalle minimal : 21 jours). • Dose de rappel : 3 mois après la dernière dose de vaccin.