

ORDONNANCES COLLECTIVES RÉGIONALES DU NUNAVIK



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
Inuulitsivik Health & Social Services Centre
Puvimutug, Québec J0M 1P0
T 819 988-2957 / F 819 988-2796



ᐅᐱᕐᕐ ᐅᕐᕐᕐ ᐅᕐᕐᕐ
UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

Initier un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2¹ par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé OC-SANTÉ PUBLIQUE

PROFESSIONNEL VISÉ PAR L'ORDONNANCE

- Personnel infirmier exerçant dans l'un des centres de santé du Nunavik, qui possède la compétence professionnelle requise, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, les habiletés et le jugement clinique inhérents à l'activité exercée.

N.B. : Le personnel d'agence doit s'assurer de posséder les connaissances, la formation et les compétences nécessaires avant de prendre une décision reliée à cette ordonnance collective.

ACTIVITÉS RÉSERVÉES AU PERSONNEL INFIRMIER

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance.

CONDITIONS D'EXERCICE

- Détenir un permis de l'OIIQ valide.

MÉDECIN RÉPONDANT

- Médecin couvrant les services cliniques des CLSC concernés durant les heures d'ouverture ou de garde au moment de l'intervention.

CLIENTÈLE VISÉE

Toute personne qui se présente dans les installations d'un CLSC du Nunavik, présentant les symptômes suivants :

- Présentant de la fièvre ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) **OU** de la toux d'apparition récente **OU** des difficultés respiratoires **OU** pertes d'odorat et du goût

ET

- Qui a des critères d'exposition ***

*** **AJUSTER SELON LES DERNIÈRES RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU NUNAVIK, VOIR ALGORITHME DÉCISIONNEL** ***

Se référer au document « *Algorithme décisionnel pour les professionnels de la santé* » le plus récemment paru².

¹ SARS-CoV-2 : pathogène en cause dans l'infection COVID-19

² Toutes les dernières versions des documents seront disponibles sur le site RRSSN : <https://nrhss.ca/fr/maladies-infectieuses/covid-19>

En vigueur : avril 2020	Révisée : avril 2020	Prochaine révision : avril 2023
OC-SANTÉ PUBLIQUE - Initier un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 1 par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé		Page 1

ORDONNANCES COLLECTIVES RÉGIONALES DU NUNAVIK



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
Inuulitsivik Health & Social Services Centre
Puvimutug, Québec J0M 1P0
T 819 988-2957 / F 819 988-2796



ᐅᐱᕐᕐᕐ ᐅᕐᕐᕐᕐ ᐅᕐᕐᕐᕐᕐ
UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

ORIENTATION

Dépister ou détecter rapidement la présence du virus SARS-CoV-2 des usagers enregistrés afin de :

- Contrôler la transmission du virus dans un mode de confinement;
- Orienter l'utilisateur vers un confinement à domicile ou un lieu de consultation, le cas échéant.

CONTRE-INDICATION À L'UTILISATION DE L'ORDONNANCE COLLECTIVE

- Toute personne présentant un état clinique sévère;
- Obstruction des voies nasales rendant un prélèvement impossible;
- Épistaxis active;
- Chirurgie récente de la bouche ou du nez;
- Laryngospasme (stridor).

INDICATIONS

- Répondre à la définition de cas en investigation ou cas contact provenant du ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) ou de la Direction de la santé publique du Nunavik.

***** VOIR ALGORITHME DÉCISIONNEL PUBLIÉ PAR LA
SANTÉ PUBLIQUE DU NUNAVIK *****

CONSULTER LE MÉDECIN

- Le patient présente des signes et symptômes d'intensité modérée à sévère :
Signes et symptômes **modérés**, tels que :
 - Diminution ou perte d'appétit significative récente;
 - Dyspnée à progression rapide;
 - Fatigue inhabituelle avec impact sur les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités de la vie domestique (AVD);
 - Œdème d'apparition nouvelle des membres inférieurs ou augmentation de l'œdème déjà connu;
 - Hémoptysie;
 - Toux fréquente à progression rapide.

ORDONNANCES COLLECTIVES RÉGIONALES DU NUNAVIK



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
Inuulitsivik Health & Social Services Centre
Puvirnituq, Québec J0M 1P0
T 819 988-2957 / F 819 988-2796



ᐅᓄᓕᓐ ᐅᓕᓕᓐ ᐅᓄᓐ ᐅᓄᓐ
UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

Signes et symptômes **sévères**, tels que :

- Altération de l'état de conscience ou détérioration rapide de l'état général;
 - Douleur thoracique d'origine cardiaque suspectée;
 - Convulsions;
 - Dyspnée sévère;
 - Fièvre chez une clientèle à risque (immunosupprimée, atteint d'une maladie chronique ou âge avancée);
 - Palpitations cardiaques avec dyspnée ou douleur thoracique associée;
 - Bradypnée ou tachypnée persistante;
 - Nausées et vomissements avec signes de déshydratation;
 - Raideur à la nuque;
 - Céphalée intense.
- Le patient présente des symptômes compatibles avec la tuberculose
 - Tout présente depuis plus de 14 jours
 - Perte de poids inexpliquée
 - Hémoptysies
 - Fièvre persistante
 - Le patient l'exige.

ÉVALUATION PHYSIQUE ET MENTALE

- L'infirmier(ère) doit effectuer les examens physiques et diagnostiques suivants :
 - L'examen physique sommaire du patient incluant les signes vitaux.

INTERVENTIONS

1. ÉVALUATION DU CAS

- Se référer au document « *Algorithme décisionnel pour les professionnels de la santé* » le plus récent paru³.

2. DÉPISTER :

- Procéder au dépistage par prélèvement **NASOPHARYNGÉ ET OROPHARYNGÉ**.
Se référer à la méthode de soins « *Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures avec écouvillon velouteux* ». N.B. : Un seul écouvillon peut être utilisé pour les deux sites de prélèvements.
- Après avoir apposé l'étiquette sur l'écouvillon, mettre celui-ci dans un sac de transport et désinfecter le sac une fois refermé.

³ Toutes les dernières versions des documents seront disponibles sur le site RRSSN : <https://nrhss.ca/fr/maladies-infectieuses/covid-19>

ORDONNANCES COLLECTIVES RÉGIONALES DU NUNAVIK



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
Inuulitsivik Health & Social Services Centre
Puvimutug, Québec J0M 1P0
T 819 988-2957 / F 819 988-2796



ᐅᐱᕐᕐᕐ ᐅᕐᕐᕐᕐ ᐅᕐᕐᕐᕐᕐ
UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

- Remplir le formulaire de laboratoire « **Signalement et demande de test de laboratoire pour Covid-19 / SARS-COV-2** » et transmettre la requête d'analyse au laboratoire avec le prélèvement.
 - Transmettre le spécimen au laboratoire selon les modalités en cours. Se référer au laboratoire PRN.
- 3. ISOLER :**
- Appliquer les mesures d'isolement préventives pour les personnes en attentes de résultat, selon les dernières recommandations de la Direction de la santé publique du Nunavik. Se référer au document « **Directions to follow for home isolation – in English, redacted by NRBHSS** ⁴ » aussi disponible en Inuktitut.

SURVEILLANCE ET SUIVI

- ❖ Si le résultat du dépistage est **NÉGATIF** :
 1. Validez avec le patient l'évolution des symptômes;
 2. Si le patient est en isolement préventif pour 14 jours, il doit quand même terminer son isolement et être testé à nouveau en présence de nouveaux symptômes ou changement significatifs.
 3. Dans le cas où le résultat permet de lever l'isolement, la Direction de la santé publique doit être consultée **avant** de lever l'isolement. L'infirmier(ère) de la santé publique en charge des enquêtes dans votre communauté devrait communiquer avec vous pour vous informer du résultat et vous autoriser à lever l'isolement.
 4. Si le patient présente des symptômes persistants, communiquez lui l'importance de reconsulter. Une toux sèche peut persister jusqu'à 3 semaines. Au-delà de 3 semaines, si la toux persiste et que le patient observe une perte de poids, de l'hémoptysies ou de la fièvre persistante aviser le patient de consulter puisque cela suggère un diagnostic alternatif (r/o tuberculose)
- ❖ Si le résultat du dépistage est **POSITIF** :
 1. **Avisez le médecin répondant du résultat de laboratoire;**
 2. Assurer, avec l'équipe médicale, le suivi clinique du patient;
 3. L'isolement sera poursuivi jusqu'à 2 prélèvements COVID-19 négatifs après la résolution des symptômes;
 4. L'infirmier(ère) de la Direction de la santé publique communiquera avec vous pour obtenir les renseignements nécessaires à la déclaration MAD0 et débiter l'enquête auprès des contacts de la personne.

⁴ Toutes les dernières versions des documents seront disponibles sur le site RRSSN : <https://nrhss.ca/fr/maladies-infectieuses/covid-19>

En vigueur : avril 2020	Révisée : avril 2020	Prochaine révision : avril 2023
OC-SANTÉ PUBLIQUE - Initier un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 1 par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé		Page 4

ORDONNANCES COLLECTIVES RÉGIONALES DU NUNAVIK



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
Inuulitsivik Health & Social Services Centre
Puvimutiq, Québec J0M 1P0
T 819 988-2957 / F 819 988-2796



ᐅᓄᓄᓄ ᐅᓄᓄᓄ ᐅᓄᓄᓄᓄᓄᓄᓄ
UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

ENSEIGNEMENT

POUR TOUS :

- Promouvoir l'hygiène des mains (HDM).
- Promouvoir l'hygiène et l'étiquette respiratoires chez les usagers présentant de la fièvre ou de la toux. (Se référer au document « Notions de base en prévention et contrôle des infections : hygiène et étiquette respiratoires » accessible via le lien : <https://www.inspq.qc.ca/publications/2439>).
- Remettre le « Guide d'auto-soins », produit par le MSSS, aussi disponible en version anglaise.

Mesures à appliquer pour les patients en isolement à domicile :

- Suivre les directives pour les mesures d'isolement à domicile émises par la Direction de la Santé publique du Nunavik, RRSSSN. Consulter le document « *Directions to follow for home isolation – in English, redacted by NRBHSS* »⁵ aussi disponible en inuktitut pour remettre aux patients.

CONTACT - SANTÉ PUBLIQUE NUNAVIK

Nom	Téléphone	Courriel
Courriel COVID pour envoi documents seulement		gardecovid.rr17@ssss.gouv.qc.ca
Eve Blanchette	418 666-7000, poste 10150	eve.blanchette.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Médecin de garde	1 855 964-2244 ou 1 819 299-2990	En dehors des heures ouvrables
Véronique Morin	1 438 521-0279	veronique.morin@ssss.gouv.qc.ca

⁵Toutes les dernières versions des documents seront disponibles sur le site RRSSSN : <https://nrhss.ca/fr/maladies-infectieuses/covid-19>

ORDONNANCES COLLECTIVES RÉGIONALES DU NUNAVIK



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
Inuulitsivik Health & Social Services Centre
Puvimtuq, Québec J0M 1P0
T 819 988-2957 / F 819 988-2796



ᐅᓄᓕᓐ ᐅᓕᓕᓐ ᐅᓄᓐᐅᓐᐅᓐ
UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

PROCESSUS D'ÉLABORATION, DE RÉVISION ET D'APPROBATION

Rédigée par : Evelyne Thibault, infirmière, et D^{re} Véronique Morin

Approuvée par :

DSI, CSI :

Linda Godin

06-04-2020

DSI, CSTU :

Dominic Pelland

02-04-2020

DSP, CSI et CSTU :

Nathalie Boulanger

02-04-2020

RÉFÉRENCES

- Institut national de santé publique. Comité sur les infections nosocomiales du Québec. *COVID-19 : Recommandations intérimaires sur les mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux aigus*. 26 février 2020.
- 811 : protocoles 1) Dyspnée d'origine indéterminé 2) Fièvre 3) Toux et 4) Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et MRSI (MAJ).
- Méthode de soins informatisée : Prélèvement des sécrétions des voies respiratoires supérieures.
- Ordonnance collective « Initier un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé », 2020-03-10, CMDP CIUSSCN.
- Procédure de dépistage coronavirus COVID-19 et MERS-CoV, Procédure – Microbiologie – 810, Département Clinique de Médecine de Laboratoire.
- « COVID-19 – Mesures pour la gestion des cas et des contacts en communauté : recommandation intérimaires », Comité permanent MRSI, Version 2.0, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, INSPQ, 20 mars 2020.
- « COVID-19 – Mesures de prévention et contrôle des infections pour les cliniques médicales / cliniques externes / cliniques COVID-19 / GMF : Recommandations intérimaires », Comité sur les infections nosocomiales du Québec, Version 1.0, Direction des risques biologiques et de la santé au travail, INSPQ, 13 mars 2020.

En vigueur : avril 2020	Révisée : avril 2020	Prochaine révision : avril 2023
OC-SANTÉ PUBLIQUE - Initier un test diagnostique pour le virus du SARS-CoV-2 1 par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé		Page 6