



Recommandations pour la priorisation des demandes d'analyse COVID-19 ID Now^{MD} au point de service – région du Nunavik

Par Simon Riendeau MD et Véronique Morin, MD

5 avril 2022

CONTEXTE

L'usage et le volume d'analyses de dépistage COVID-19 sur la plateforme ID Now^{MD} dans les communautés restent à la discrétion des équipes cliniques dans la mesure où elles sont dépendantes des ressources (humaines et matérielles) disponibles dans ces équipes (nombre de plateformes déployées, personnel formé disponible, ressources dédiées, etc...).

Les recommandations plus bas décrivent comment gérer les demandes lorsqu'elles dépassent l'offre disponible.

Des modifications sont apportées pour refléter les changements dans l'épidémiologie, les changements dans la GCC et l'avènement des traitements pharmacologiques contre la COVID-19.

PRIORISATION

#1 Patient ayant une indication clinique pour recevoir un traitement pharmacologique contre la COVID-19¹

#2 Travailleur critique identifié comme contact et/ou symptomatique, qui reste en poste

#3 Personne à risque d'exposer un milieu vulnérable (détenu, patient ou employé vers milieux de soins ou milieu de vie, medevacs, etc...)

#4 Patient symptomatique en situation de vulnérabilité (autre que priorisation #1)

#5 Patient symptomatique

¹ Il est recommandé de procéder à une analyse ID Now^{MD} ou PCR pour toute personne pouvant bénéficier d'un traitement pharmacologique contre la COVID-19. Toutefois, si un TDAR a été fait et il s'avère positif, il n'est pas nécessaire de procéder au ID Now^{MD} ou au PCR; si il s'avère négatif, il est recommandé de compléter par un ID Now^{MD} ou un PCR.