



Algorithme décisionnel - Vaccination avec le BCG

Compléter la section A du *Formulaire de vaccination pour le BCG* afin de déterminer l'éligibilité de l'enfant à la vaccination avec le BCG

Contre-indications à la vaccination

- Problème d'immunité acquis à la naissance dans la famille biologique immédiate
- Mère biologique et/ou enfant positif(tive) au VIH
- Problème du système immunitaire, hérité de ses parents biologiques
- Résultat positif au test du DICS

Précaution particulière

- Prise d'agents biologiques par la mère durant sa grossesse, chez le nourrisson âgé de moins de 6 mois

OUI → Référer au MD traitant pour évaluation complémentaire PRN. Si contre-indication confirmée, consigner au dossier et au registre de vaccination (SI-PMI).

NON → Résultat DICS reçu ET négatif

NON → Si résultat non reçu dans le délai établi, communiquer avec la personne responsable selon trajectoire du CS. Replanifier le RV de vaccination lors de la réception du résultat.

Exposition

- Prise d'une médication anti-tuberculeuse (prophylaxie fenêtre, traitement pour TB latente ou pour TB active)
- TCT antérieur significatif¹
- Identifié comme un contact de TB active

OUI → Replanifier le rdv de vaccination à la fin du traitement / à la fin de la prise en charge par l'infirmière TB

Évaluation de la nécessité d'un TCT avant la vaccination

- < 2 mois: Administrer le BCG sans TCT préalable.
- ≥ 2 à < 6 mois: Jugement clinique de l'infirmière et décision partagée avec le parent en fonction du risque d'exposition à la tuberculose²
- ≥ 6 mois à < 24 mois: Effectuer un TCT et administrer le BCG si le résultat du TCT est non significatif¹.

NON → Compléter la section B du *Formulaire de vaccination pour le BCG*. Si indiqué, administrer le BCG.

¹ TCT non significatif	< 5 mm dans un village prioritaire OU < 10 mm dans un village non prioritaire*
TCT significatif	≥ 5 mm dans un village prioritaire OU ≥ 10 mm dans un village non prioritaire*
Conversion	≥ 6 mm entre le TCT actuel et le TCT antérieur non significatif ou TCT actuel ≥ 10 mm

*Pour connaître la liste des villages prioritaires, référez-vous à la [Boîte à outils TB](#).

² Pour évaluer le risque d'exposition du BB à la TB: questionner les parents sur l'historique de TB active ou latente chez les autres membres de la maison où vit le BB, et chez tout proche passant du temps avec l'enfant.

Marche à suivre par le vaccinateur en fonction de l'issue de l'évaluation du risque d'exposition à la TB:

- Effectuer un TCT en une étape avant d'administrer le vaccin BCG si le risque d'une exposition préalable à la tuberculose est élevé; OU
- Administrer le vaccin BCG sans effectuer de TCT s'il y a refus du parent ou s'il y a possibilité que le nourrisson ne revienne pas se faire vacciner après avoir subi le test cutané.