

## CALENDRIER RÉGULIER D'IMMUNISATION DU NUNAVIK (MAJ 2026-02-09)

Âge	Antigènes à administrer				Produits immunisants suggérés, Par noms commerciaux et leurs équivalents
À la naissance	Ac-VRS* (1)				Nirsévimab (Beyfortus)
1 mois	BCG (2)				BCG Japan
2 mois	DCaT- HB - VPI - Hib	Pneu-C-20 (3)	Rota (4)		Infanrix hexa / Prevnar20 / RotaTeq ou Rotarix
4 mois	DCaT- HB - VPI - Hib	Pneu-C-20 (3)	Rota (4)		Infanrix hexa / Prevnar20 / RotaTeq ou Rotarix
6 mois (5 - 6)		Pneu-C-20 (3)	Influenza (7)		Prevnar20
1 an (8)	DCaT-VPI - Hib	Pneu-C-20 (3)	RRO-Var	Influenza (7)	Pediacel ou Pentacel / Prevnar20 / Proquad ou Priorix-Tetra
18 mois	HA-HB	Men-C-C	RRO-Var	Influenza (7)	Twinrix Jr / Neisvac-C ou Menjugate / Proquad ou Priorix-Tetra
4 à 6 ans	dcaT- VPI		+ mise à jour du statut vaccinal	Influenza HA (9) (7)	Adacel-Polio ou Boostrix-Polio
4 <sup>e</sup> année	VPH-9	HA (9)		Influenza (7)	Gardasil 9 / Havrix (720 U) ou Vaqta (25 U)
Secondaire 0 (10)	dT (11)	HB (12)	Men-C-ACWY (13)	+ mise à jour du statut vaccinal	Influenza HA (9) (7) dT adsorbées / Engerix B (0,5 mL) ou Recombivax HB (0,5 mL) / Nimenrix
Femme enceinte	dcaT (14)			Influenza HA (9) (7)	Adacel ou Boostrix
50 ans (15)	dT (11 - 16)	Pneu-C-20 (17)	+ mise à jour du statut vaccinal	Influenza HA (9) (7)	dT adsorbées / Prevnar20
71 ans	Zona-SU (18)			Influenza (7)	Shingrix

**Notes:**

\*Bien que l'Ac-VRS ne soit pas un vaccin, il est inclus dans le calendrier régulier de vaccination des nourrissons.

- Anticorps monoclonal à administrer le plus tôt possible après la naissance (en saison du VRS).
- Administrer le BCG aux enfants de moins de 24 mois du Nunavik si résultat négatif au dépistage du DICS.
- Au Nunavik, le Pneu-C-20 est le vaccin disponible pour l'immunisation régulière des enfants. Tel que mentionné au PIQ, le vaccin Pneu-C-20 peut être utilisé si le Pneu-C-15 n'est pas disponible.
- La vaccination contre le rotavirus doit être débutée avant l'âge de 20 semaines et complétée avant l'âge de 8 mois. Pour les enfants immunodéprimés ou susceptibles de l'être, les enfants avec antécédents d'invagination intestinale ou ceux présentant des symptômes de gastroentérites aigüe : référer au PIQ.
- Une dose additionnelle de DCaT-VPI-Hib est administrée à 6 mois pour les enfants immunodéprimés, prématurés (< 32 semaines), de très faible poids de naissance (<1500g), présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle ou un implant cochléaire (Voir PIQ).
- Une dose additionnelle de Pneu-C-20 est offerte à 6 mois au Nunavik. Si cette dose est omise, elle peut être rattrapée jusqu'à l'âge de 11 mois.
- Le vaccin contre l'influenza est recommandé annuellement durant la saison grippale à toute personne vivant dans les communautés éloignées/ isolées, dès l'âge de 6 mois. Chez l'enfant de moins de 9 ans, 2 doses sont requises à 4 semaines d'intervalle s'il s'agit de la 1<sup>ère</sup> année où l'enfant reçoit le vaccin.
- Administrer DCaT-VPI-Hib, Pneu-C-20, RRO-Var le jour du 1<sup>er</sup> anniversaire ou le plus tôt possible après.
- Au Nunavik, la vaccination contre l'hépatite A est recommandée pour toute personne de 18 mois et plus non-adéquatement protégée. Compléter la vaccination si nécessaire (Pour être considéré adéquatement protégée, 1 dose du composant HA est requise pour les personnes vaccinées entre 1 an et 19 ans OU 2 doses si la personne est vaccinée à ≥ 20 ans, à un intervalle recommandé de 6 à 12 mois). Pour la dose prévue en 4<sup>ème</sup> année, celle-ci peut être omise si au moins 1 dose de vaccin contre l'HA a été reçue depuis l'âge de 1 an.
- Les vaccins prévus en 3<sup>ème</sup> secondaire dans le PIQ sont donnés en secondaire 0 au Nunavik.
- Si le vaccin dT n'est pas disponible, il est possible d'utiliser le vaccin dcaT, même si la composante coqueluche n'est pas requise pour la protection. Cette pratique est sécuritaire.
- Omettre cette dose si 2 doses de HB ont été reçues après l'âge de 1 an OU 3 doses au total depuis la naissance, en respectant les intervalles minimaux recommandés selon le PIQ.
- Omettre cette dose si 1 dose de Men-C-ACWY a été administrée à l'âge de 10 ans ou plus.
- Vacciner les femmes enceintes contre la coqueluche à chaque grossesse, peu importe les antécédents vaccinaux. Vacciner de préférence entre 26 et 32 semaines de gestation.
- Pour les bénéficiaires de la CBJNQ âgés de 50 à 70 ans, les frais de vaccination contre le zona sont couverts par le programme SSNA selon critères du programme (se référer à l'algorithme « Vaccination contre le zona » de la RSSSN pour les détails d'admissibilité).
- Omettre cette dose si une dose de dT a été administrée depuis l'âge de 40 ans.
- Administrer 1 dose de vaccin Pneu-C-20 aux personnes de 50 ans et plus vivant au Nunavik. Un intervalle minimal d'un an doit être respecté entre tout vaccin Pneu-C ou Pneu-P et l'administration du Pneu-C-20.
- Le calendrier recommandé pour la vaccination contre le zona comprend 2 doses, données à un intervalle recommandé de 2 à 12 mois.

**ATTENTION!** Ce calendrier n'inclut pas les recommandations spécifiques s'adressant à une **clientèle immunodéprimée, asplénique, vivant avec des conditions médicales ou facteur(s) de risque particulier(s)** (ex : maladies chroniques, itinérance, utilisation de drogues dures, harsah, etc.). Vous devez vous référer au PIQ pour des recommandations vaccinales adaptée à cette clientèle et suivre les calendriers spécifiques lorsque applicable.