

Procédure d'abattage sécuritaire de renards et d'élimination des carcasses en milieu nordique

Les activités menant à l'utilisation de cette procédure doivent être réalisées conformément aux lois et règlements applicables. Cette procédure vise les situations suivantes :

- Renard avec ou sans signes de rage présent dans une communauté ou à proximité d'installations humaines;
- Renard capturé dans un piège à patte.

Consignes générales

- Ne touchez pas une carcasse à mains nues. Portez des gants.
- Ne touchez pas à vos yeux, à votre bouche ou à votre nez pendant et après avoir manipulé des carcasses ou du matériel potentiellement contaminés.
- Évitez de manger, de boire ou de fumer lors de la manipulation de carcasses ou lors du nettoyage du matériel.
- Assurez-vous que les jeunes enfants et les animaux domestiques restent éloignés des carcasses.
- Ne laissez pas les animaux domestiques toucher ou manger les carcasses.

SOYEZ PRUDENTS!

En cas de contact avec un animal sauvage lors de vos activités de piégeage ou d'abattage (ex. : éclaboussure sur une plaie ou une muqueuse – yeux, nez ou bouche –, éraflure avec la carcasse, morsure ou coupure lors du dépiantage) :

- Nettoyez la plaie, même si elle semble mineure, ou le site du contact avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes;
- Consultez rapidement votre CLSC afin d'obtenir une évaluation et les soins requis selon votre situation.

Matériel requis

- ☐ Sacs de plastique robustes
- ☐ Gants épais lavables (ex. : gants de travail, gants d'hiver)
- ☐ Gants jetables
- ☐ Bacs de plastique étanches
- ☐ Lingettes désinfectantes (ex. : Clorox, Lysol)
- ☐ Gel désinfectant pour les mains dont la concentration est d'au moins 60 % d'alcool
- ☐ Produit désinfectant
- ☐ Eau et savon

1. Abattage

- Utilisez une arme à feu de petit calibre (ex. : calibre .22).
- Visez la zone vitale du renard (cœur-poumon). Cette zone se situe au thorax, en haut de la patte avant (voir image).
- En dernier recours, si un tir dans la zone vitale n'est pas possible, visez la tête (entre les deux yeux). Tirez avec un angle vers le bas afin d'atteindre également la colonne vertébrale.
ATTENTION : Le tir dans la tête augmente le risque d'exposition à des tissus et liquides contenant le virus de la rage. Cette méthode doit être évitée avec les renards démontrant des signes de la maladie.



2. Ramassage des carcasses

- Portez des gants épais lavables ou jetables.
- Placez la carcasse dans un sac de plastique en évitant de la manipuler directement, si possible.
- Utilisez une pelle ou encore la technique du sac retourné : placez les mains dans le sac et saisissez la carcasse au travers du sac, puis retournez le sac sur la carcasse. Faites attention aux dents, griffes et fragments osseux qui pourraient perforer le sac, vous blesser et possiblement vous contaminer.
- Refermez le sac en faisant un nœud.
- Placez le sac dans un deuxième sac de plastique et nouez-le.
- Accumulez les carcasses dans un bac de plastique fermé afin d'éviter de contaminer des objets ou des surfaces avec les liquides et tissus provenant des carcasses.
- Si vous avez sali vos vêtements durant le ramassage des carcasses, placez-les dans un sac de plastique noué en attendant de les laver.
- Lavez-vous les mains avec des lingettes désinfectantes ou un gel désinfectant en attendant de pouvoir les laver à l'eau et au savon.

3. Gestion et élimination sécuritaire des carcasses

- Ne laissez pas les carcasses sur place ou à découvert dans un lieu d'enfouissement, car elles pourraient attirer d'autres animaux sauvages ou des animaux domestiques.
- N'accumulez pas des carcasses à proximité des habitations ou dans les rues. Assurez-vous qu'elles soient placées dans des bacs fermés jusqu'à ce que vous les éliminiez.
- Ne nourrissez pas vos animaux domestiques avec des carcasses de renards ou de loups.
- Si possible, brûlez les carcasses dans un lieu d'enfouissement, en respectant la réglementation.
- S'il n'est pas possible de brûler les carcasses, enterrez-les profondément dans le sol (si possible, par exemple en été).

4. Nettoyage

Le virus de la rage est détruit par la plupart des désinfectants usuels et il ne survit pas longtemps sur les surfaces.

ATTENTION : Le virus survit à la congélation.

- Portez des gants lors du nettoyage et lavez-vous les mains une fois le nettoyage effectué.

Vêtements souillés par des liquides et tissus provenant des carcasses :

- Lavez les vêtements à la laveuse, à l'eau chaude, avec un détergent domestique.
- Séchez les vêtements à la sècheuse, au cycle chaud si possible.

Surfaces et équipements souillés par des liquides et tissus provenant des carcasses :

- Nettoyez avec de l'eau et du savon pour enlever la majorité des saletés. Utilisez une brosse au besoin.
- Désinfectez les surfaces contaminées avec une solution d'eau de Javel¹ diluée (1 partie d'eau de Javel pour 9 parties d'eau).
- Laissez agir au moins 30 secondes avant de rincer et d'essuyer.
- Lorsque l'utilisation de la solution d'eau Javel n'est pas possible (ex. : volant de camion), utilisez des lingettes désinfectantes.

¹ Une solution virucide commerciale peut aussi être utilisée (ex : Virkon® 1 %, Clinicide®, CaviCide®). Laissez agir selon les consignes du fabricant.

Consignes spécifiques aux activités de chasse et de trappage

La fourrure d'un renard peut être utilisée, en respectant les lois et règlements applicables.

ATTENTION : La carcasse d'un renard qui présente des signes de rage devrait être brûlée, y compris la fourrure.

Le virus de la rage est présent principalement dans la salive, le cerveau, la moelle épinière et les glandes salivaires. Il n'est pas présent dans le sang, les fèces ou l'urine d'un animal infecté.

- Portez toujours des gants jetables lors du dépiantage d'un animal sauvage. Cela permet de vous protéger contre des parasites ou des maladies, dont la rage.
- Appliquez en tout temps les consignes générales fournies en première page.

Version du 29 janvier 2025

