

COVID-19 : INDICATIONS DE DÉPISTAGE ET ALGORITHMES DÉCISIONNELS CLINIQUES¹

TYPES DE TESTS DE DÉPISTAGE RECOMMANDÉS SELON LA SITUATION DU PATIENT

(peu importe le test recommandé, la positivité de tous ces tests reflète une infectiosité qui ne requiert pas de confirmation)

INDICATIONS DE DÉPISTAGE POUR LA COVID-19 ²	Situation du patient	TDAR q 48h x2 ³	ID NOW	PCR	Lucira
Patient en contexte de soins	Patient admis en soins aigus ou en milieu d'hébergement, incluant son escorte familiale, selon les règles en vigueur dans votre établissement	X	✓ ⁴	✓	X
	Medévac	X	✓	✓	✓
Personne de plus de 6 mois avec symptôme(s) de COVID-19	Travailleur de la santé avec symptômes de COVID-19	X	✓	✓	✓
	Patient ambulatoire pour lesquels un traitement pour la COVID-19 est envisagé	X	✓	✓	X
	Patient immunosupprimé ou vulnérable	X	✓	✓	X
Directives de santé publique ou du MSSS	Patient ambulatoire avec symptômes de COVID-19	✓	✓	✓	✓
	Usager ou travailleur d'un milieu en éclosion sur recommandation de la santé publique	X	✓	✓	X
	Patient voyageant vers le CUSM – test fait à Ullivik (cf mémo du CSI du 2023-02-23 – <i>Tests COVID-19 pré-départ pour les usagers voyageant vers Ullivik</i> déposé dans la boîte à outils COVID-19 et infections respiratoires)	X	✓	✓	✓
	Autres recommandations	Selon directive			
Ceci n'est plus une indication de dépistage	Personne asymptomatique ayant été en contact avec un cas de COVID-19	X	X	X	X

