



## VACCINATION COVID-19 SUR UN SITE **ALTERNATIF**:

### Matériel requis :

- Glacière de transport 2-8C.
- Thermomètre Min/Max + feuille de relevé des T°
- Matériel d'urgence (Épinéphrine, etc.)
- Moyen de communication rapide avec CLSC (pour urgence, demandes d'information, etc.)
- Feuilles d'information, **formulaires de consentement**, ÉPI, matériel de désinfection, etc.
- **Ne pas oublier les diluants Pfizer + Pfizer pédiatrique** (T° ambiante; ne pas congeler)

- **Si réfrigérateur 2-8°C disponible (T° stable depuis ≥ 12 heures, ou ≥48 heures si nouvel appareil) :**
  - Y placer les doses. Monitorer les températures avec un **thermomètre Min-Max BID** (consigner au relevé).
- **Si aucun réfrigérateur 2-8°C sur place:**
  - Conserver les doses dans la **glacière de transport entre 2-8°C**.
  - Monitorer les températures des vaccins avec un **thermomètre Min-Max** (Réinitialiser le thermomètre après chaque lecture) :
    - À l'arrivée sur les lieux
    - Avant le début de la séance de vaccination;
    - Toutes les heures durant la séance;
    - À la fermeture de la séance.
  - Consigner chaque température au relevé.

	<b>FIOLES ENTAMÉES – délai de conservation maximal</b> Si des fioles ne peuvent être écoullées sur place, voir tableau suivant
<b>MODERNA</b>	<b>24 heures</b> après ouverture de la fiole conservée entre 2-8C; <b>Seringues pré-remplies : 6 heures</b> , en tenant compte du délai maximal depuis ouverture de la fiole.
<b>PFIZER</b>	<b>6 heures</b> après ouverture de la fiole conservée entre 2-8C; <b>Seringues pré-remplies : 6 heures</b> , en tenant compte du délai maximal depuis ouverture de la fiole.
<b>PFIZER PÉDIATRIQUE</b>	<b>12 heures</b> après ouverture de la fiole conservée entre 2-8C; <b>Seringues pré-remplies : 12 heures</b> , en tenant compte du délai maximal depuis ouverture de la fiole.

<b>Les doses qui ont été déplacées doivent idéalement être utilisées sur place.</b> <b>SI DES DOSES NE PEUVENT ÊTRE ÉCOUILLÉES SUR PLACE :</b>			
	<b>MODERNA</b>	<b>PFIZER</b>	<b>PFIZER PÉDIATRIQUE</b>
<b>Fioles non-entamées entre 2-8°C :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peuvent être ramenées au CLSC.</li> <li>• Utiliser en priorité.</li> <li>• Apposer une étiquette sur la fiole: « Ne pas redéplacer ».</li> </ul>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
<b>Fioles entamées entre 2-8°C :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut être ramenées au CLSC.</li> <li>• Apposer une étiquette sur la fiole: « Ne pas redéplacer ».</li> <li>• Jeter après le délai de conservation maximal post-ouverture.</li> </ul>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>X</b> Toute dose non-utilisée sur place doit être détruite.
<b>Seringues pré-remplies :</b>	<b>Doivent être utilisées sur place.</b> Les seringues non-utilisées seront considérées comme pertes.		

