

## Calendrier régulier de vaccination contre la COVID-19 et dose additionnelle au Nunavik

Le tableau suivant présente les recommandations applicables à la région du Nunavik sur le nombre de doses de vaccins contre la COVID-19 nécessaires pour développer une réponse immunitaire adéquate selon l'âge, la condition de la personne et ses antécédents d'infection à la COVID-19. Pour certains groupes, le CIQ recommande également une **dose additionnelle** pour consolider la protection à compter de la fin de l'été 2022, **peu importe le nombre de doses reçues auparavant**. Le [PIQ](#) demeure l'outil de référence et doit être consulté pour de plus amples détails.

Recommandations pour le calendrier régulier <sup>1</sup> et la dose additionnelle de vaccin contre la COVID-19				
Âge	Condition	Sans antécédent d'infection au SRAS-CoV-2	Avec antécédent d'infection(s) au SRAS-CoV-2 <sup>2</sup>	Dose additionnelle <sup>3-4</sup>
6 mois à 4 ans	Immunodépression ou dialyse	Primo 3 doses	Primo 3 doses	Non
	Tous les autres	Primo 2 doses	Primo 1 dose <sup>5</sup>	Non
5 à 11 ans	Immunodépression ou dialyse	Primo 3 doses + 1 rappel	Primo 3 doses + 1 rappel	Non
	Autres conditions à risque élevé de complications	Primo 2 doses + 1 rappel	Total de 2 doses <sup>6</sup>	Non
	Tous les autres	Primo 2 doses <sup>7</sup>	Primo 1 dose <sup>5</sup>	Non
12 à 17 ans	Immunodépression ou dialyse	Primo 3 doses + 1 rappel	Primo 3 doses + 1 rappel	Oui
	Autres conditions à risque élevé de complications	Primo 2 doses + 1 rappel	Total de 2 doses <sup>6</sup>	Oui
	Vivant dans un milieu collectif	Primo 2 doses + 1 rappel	Total de 2 doses <sup>6</sup>	Autorisée
	Tous les autres	Primo 2 doses <sup>7</sup>	Primo 1 dose <sup>5-7</sup>	Autorisée
18 ans et plus	Immunodépression ou dialyse	Primo 3 doses + 1 rappel	Primo 3 doses + 1 rappel	Oui
	Tous les autres adultes (au Nunavik)	Primo 2 doses + 1 rappel	Total de 2 doses <sup>6</sup>	Oui

<sup>1</sup> La primovaccination des personnes vaccinées à l'étranger doit être complétée conformément à l'outil « *Recommandations pour les personnes qui ont été vaccinées contre la COVID-19 à l'étranger* ». Les indications du présent document quant aux doses de rappel et à la dose additionnelle s'appliquent également à ces individus.

<sup>2</sup> Confirmée par TAAN ou par test antigénique (TDAR).

<sup>3</sup> Le CIQ recommande une dose additionnelle de vaccin contre la COVID-19 à certaines personnes, même si elles ont déjà reçu une ou deux doses de rappel, et qu'elles aient contracté ou non une infection confirmée à la COVID-19 dans le passé. Un intervalle minimal de 3 mois est recommandé depuis la dernière dose reçue ou depuis une infection au SRAS-CoV-2 confirmée.

<sup>4</sup> Si le vaccin donné durant cette campagne correspond à la dernière dose de la vaccination de base, il n'est pas nécessaire de prévoir une dose additionnelle pour le moment.

<sup>5</sup> Chez les personnes immunocompétentes avec antécédent d'infection(s) par le SRAS-CoV-2, une seule dose est recommandée en primovaccination. Ces personnes peuvent toutefois choisir de recevoir une 2<sup>e</sup> dose. Si l'infection a débuté moins de 21 jours avant la 1<sup>re</sup> dose ou est survenue après la 1<sup>re</sup> dose, administrer un total de 2 doses.

<sup>6</sup> Pour les personnes visées par la recommandation d'une dose de rappel et ayant fait l'infection à la COVID-19, on administrera un total de 2 doses. Une dose de rappel (3<sup>e</sup> dose) n'est pas nécessaire, mais peut être administrée si la personne la demande.

<sup>7</sup> Une dose de rappel peut être offerte aux personnes âgées de 5 à 17 ans en bonne santé qui en font la demande.