



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
Inuulitsivik Health & Social Services Centre
Puvirnituq, Québec J0M 1P0
T 819 988-2957 / F 819 988-2796

ᐅᐱᕐᕐᕐ ᐅᐱᕐᕐᕐ ᐅᐱᕐᕐᕐ
UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

INFECTION TUBERCULOSE LATENTE ADULTE ET PÉDIATRIQUE (2 à 65 ans) PROTOCOLE DE SUIVI – ORDONNANCE MÉDICALE STANDARD • 3HP (Rifapentine- Isoniazide) TOD 1x/sem

EMBOSSER ICI LA CARTE DU CSI OU CSTU,
SI NON DISPONIBLE, INSCRIRE LES NOM, PRÉNOM,
DATE DE NAISSANCE ET NUMÉRO DOSSIER
EMBOSS HERE THE CARD OF IHC OR UTHC,
IF NOT AVAILABLE, WRITE THE NAME, SURNAME,
DATE OF BIRTH AND FILE NUMBER

But : Uniformiser la prise en charge des cas d'infection tuberculeuse latente (ITL) et assurer la prescription médicale du suivi nécessaire par les différents professionnels de la santé concernés.

Objectifs :

- S'assurer d'une prophylaxie optimale contre l'ITL afin de prévenir l'apparition d'une tuberculose active.
- Détecter précocement les événements indésirables et assurer leur prise en charge.
- Identifier rapidement les problèmes d'observance et offrir le soutien approprié.

Cette ordonnance doit être initiée par un médecin au moment du diagnostic de l'ITL et de la prescription d'antituberculeux.

Notes: → Pour rejoindre les médecins répondants en pneumologie :

- Pneumologue pédiatrique : écrire à MCHTB & 06CH_CUSM MCHTB@MUHC.MCGILL.CA ou Zofia Zysman-Colman (Med) zofia.zysman-colman.med@ssss.gouv.qc.ca
- Pneumologue pour adulte : Privilégier le système SAFIR : [Se connecter à SAFIR \(gouv.qc.ca\)](#)
Si SAFIR inaccessible, écrire à : Faiz Ahmad Khan faiz.ahmad.khan.med@ssss.gouv.qc.ca ou Richard Menzies, Dr. dick.menzies@mcgill.ca
- Pneumologue de garde au CUSM : **514 934-1934**.

→ Lorsqu'une personne est nouvellement diagnostiquée ITL, aviser Tuberculose Santé Publique (RRSSSN) tuberculose-santepublique.nrbhss@ssss.gouv.qc.ca.

Note importante: Toute prescription médicale individuelle a préséance sur le suivi « Standard » décrit dans cette procédure.

Instruction d'utilisation du protocole

L'ordonnance suivante, une fois signée et datée par le médecin, sert de prescription médicale pour les bilans et les examens paracliniques nécessaires au suivi des patients atteints d'ITL. L'infirmière et le médecin doivent signer et cocher les cases qui se rapportent à leurs tâches respectives au fur et à mesure que les actions auront été prises.

Les prescriptions de médicaments se feront cependant sur les feuilles de prescription spécifiques au traitement de l'ITL.

- Rédigé par : Dre Valérie Messier et Dre Geneviève Auclair, médecins-conseil en maladies infectieuses de la RRSSSN, ainsi que Pascale Desjardins et Marie-Neige Dion, conseillères en maladies infectieuses de la RRSSSN
- Révisé par : Dr Gabriel Chouinard du CSI
Dre Julie Desjardins et Jessica Trahan de la RRSSSN
Dre Zofia Zysman-Colman
- Approuvé par : Comité exécutif du CMDPSF du CSI le 2023-09-12
Comité exécutif du CMDPSF du CSTU le 2023-12.



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
Inuulitsivik Health & Social Services Centre
Puvirnituq, Québec J0M 1P0
T 819 988-2957 / F 819 988-2796

ᐅᐱᕐᕐᕐ ᐅᐱᕐᕐᕐ ᐱᕐᐅᐱᕐᕐᕐ
UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

INFECTION TUBERCULOSE LATENTE
ADULTE ET PÉDIATRIQUE (2 à 65 ans)
PROTOCOLE DE SUIVI – ORDONNANCE
MÉDICALE STANDARD • 3HP (Rifapentine-
Isoniazide) TOD 1x/sem

EMBOSSER ICI LA CARTE DU CSI OU CSTU,
SI NON DISPONIBLE, INSCRIRE LES NOM, PRÉNOM,
DATE DE NAISSANCE ET NUMÉRO DOSSIER
EMBOSS HERE THE CARD OF IHC OR UTHC,
IF NOT AVAILABLE, WRITE THE NAME, SURNAME,
DATE OF BIRTH AND FILE NUMBER

Résultat de Quantiféron positif le : ____aaaa / ____mm / ____jj (si applicable)

Résultat du TCT: _____ mm Date : ____aaaa / ____mm / ____jj

Valeurs seuils du résultat du TCT et indications de traitement de l'ITL

TCT	Indications de traitement préventif
≥ 5 mm	<input type="checkbox"/> Personne résidant dans un village prioritaire¹ <input type="checkbox"/> Dépistage de masse dans un contexte d'éclosion ET selon la DSPu du Nunavik <input type="checkbox"/> Enfant vacciné au BCG depuis < 24 mois
≥ 5 mm	<input type="checkbox"/> Infection à VIH <input type="checkbox"/> Contact récent avec un cas de tuberculose contagieuse <input type="checkbox"/> Maladie fibronodulaire visible à la radiographie pulmonaire (tuberculose guérie, mais non traitée antérieurement ou traitée inadéquatement) <input type="checkbox"/> Greffe d'organe (associée à un traitement immunosuppresseur) <input type="checkbox"/> Autres médicaments immunosuppresseurs, p. ex. corticoïdes (l'équivalent de ≥ 15 mg/jour de prednisone pendant 1 mois ou plus; le risque de tuberculose active augmente avec la dose et la durée du traitement) <input type="checkbox"/> Insuffisance rénale nécessitant une hémodialyse <input type="checkbox"/> Prise d'inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha [TNFα],
≥ 10 mm	<input type="checkbox"/> Personne résidant dans un village non prioritaire selon la DSPu du Nunavik <input type="checkbox"/> Virage dans les 2 dernières années sans exposition connue <input type="checkbox"/> Virage à la suite d'un contact récent, peu importe le délai écoulé entre les 2 TCT <input type="checkbox"/> Autre déficit immunitaire (cancer de la tête et du cou) <input type="checkbox"/> Silicose <input type="checkbox"/> Les personnes de tous âges ayant voyagé au cours des 2 dernières années dans un pays à incidence élevée en tenant compte de la durée de séjour et du type d'activités réalisées <input type="checkbox"/> Les utilisateurs de drogues par injection, séronégatifs pour le VIH • Les travailleurs ou les résidents d'un établissement de santé ou d'un établissement correctionnel • Les travailleurs de refuges pour sans-abri • Les sans-abri qui peuvent être traités dans le cadre d'un traitement préventif sous observation directe <input type="checkbox"/> Tout autre patient considéré comme à risque accru (diabète sucré, insuffisance pondérale, fumeur d'un paquet ou plus par jour)

Signature du MD : _____ N° permis : _____ Date : ____aaaa / ____mm / ____jj

¹ Pour connaître la liste des villages prioritaires établie par la Direction de santé publique, se référer à [Boîte à outils – Tuberculose](#).
(DSPu-TB_ITL_PROT-SUIVI-3HP, V2023-11-16)



Centre de Santé et Services Sociaux Inuułitsivik
Inuułitsivik Health & Social Services Centre
Puvirnituq, Québec J0M 1P0
T 819 988-2957 / F 819 988-2796

ᐅᐱᕐᕐᕐ ᐅᐱᕐᕐᕐ ᐅᐱᕐᕐᕐ
UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

**INFECTION TUBERCULOSE LATENTE
ADULTE ET PÉDIATRIQUE (2 à 65 ans)
PROTOCOLE DE SUIVI – ORDONNANCE
MÉDICALE STANDARD • 3HP (Rifapentine-
Isoniazide) TOD 1x/sem**

EMBOSSER ICI LA CARTE DU CSI OU CSTU,
SI NON DISPONIBLE, INSCRIRE LES NOM, PRÉNOM,
DATE DE NAISSANCE ET NUMÉRO DOSSIER
EMBOSS HERE THE CARD OF IHC OR UTHC,
IF NOT AVAILABLE, WRITE THE NAME, SURNAME,
DATE OF BIRTH AND FILE NUMBER

Temps	Suivi	Interventions et Investigations	Date et Signature
Fin de Tx (12 ^e semaine) AA/ MM/ JJ	MD	<input type="checkbox"/> Documenter l'observance et la fin de traitement <input type="checkbox"/> Compléter et signer le <i>Guide de suivi clinico-radiologique</i> en post fin de traitement (<i>TB-ACT-ITL_GUIDE-SCR</i>) <input type="checkbox"/> Mettre à jour la liste des problèmes (antécédents) au dossier patient	Signature AA/ MM/ JJ
	Inf.	<input type="checkbox"/> Suivi mensuel régulier: Si anormal, aviser le médecin <input type="checkbox"/> Suivi de la médication / soutien au client (<i>ITL_ENREG-MED-3HP</i>) <input type="checkbox"/> Évaluation clinique à chaque dose administrée (<i>ITL_EVAL-CLIN-HEBDO-3HP</i>) <input type="checkbox"/> Selon prescription médicale : <input type="checkbox"/> Faire prélèvements sanguins PRN : bilan hépatique, créat, FSC. <input type="checkbox"/> Faire β-hCG urinaire ⁶ <input type="checkbox"/> Planifier suivi clinico-radiologique selon avis médical inscrit au formulaire <i>Guide de suivi clinico-radiologique</i> (<i>TB-ACT-ITL_GUIDE-SCR</i>) <input type="checkbox"/> Acheminer tous ces documents complétés à la DSPu	Signature AA/ MM/ JJ

Signature du MD: _____ N° permis: _____ Date: ____/ ____/ ____



Centre de Santé et Services Sociaux Inuulitsivik
 Inuulitsivik Health & Social Services Centre
 Puvirnituq, Québec J0M 1P0
 T 819 988-2957 / F 819 988-2796

ᐅᐱᕐᕋᕐᕋ ᐅᐱᕐᕋᐱᕐᕋ ᐱᕐᕋᐱᕐᕋᐱᕐᕋ
 UNGAVA TULATTAVIK HEALTH CENTER
 CENTRE DE SANTÉ TULATTAVIK DE L'UNGAVA

EMBOSSER ICI LA CARTE DU CSI OU CSTU,
 SI NON DISPONIBLE, INSCRIRE LES NOM, PRÉNOM,
 DATE DE NAISSANCE ET NUMÉRO DOSSIER

EMBOSS HERE THE CARD OF IHC OR UTHC,
 IF NOT AVAILABLE, WRITE THE NAME, SURNAME,
 DATE OF BIRTH AND FILE NUMBER

**INFECTION TUBERCULOSE LATENTE
 ADULTE ET PÉDIATRIQUE (2 à 65 ans)
 PROTOCOLE DE SUIVI – ORDONNANCE
 MÉDICALE STANDARD • 3HP (Rifapentine-
 Isoniazide) TOD 1x/sem**

GUIDE DE SUIVI POUR SEMAINES SUPPLÉMENTAIRES
Retard dans la durée prévue du traitement
 À utiliser si le traitement se prolonge au-delà de 12 semaines. Appliquer les interventions de la ligne *Fin de traitement* si des semaines supplémentaires sont nécessaires pour compléter le traitement. Au-delà de 16 semaines, la prophylaxie est considérée inadéquate si prise de moins de 11 doses.

Temps	Suivi	Interventions et Investigations	Date et Signature
Fin de Tx (12 à 16 semaines) AA/ MM/ JJ	MD	<input type="checkbox"/> Documenter l'observance et la fin de traitement <input type="checkbox"/> Compléter et signer le <i>Guide de suivi clinico-radiologique</i> en fin de traitement (TB-ACT-ITL_GUIDE-SCR) <input type="checkbox"/> Mettre à jour la liste des problèmes (antécédents) au dossier patient	Signature AA/ MM/ JJ
	Inf.	<input type="checkbox"/> Suivi mensuel régulier: Si anormal, aviser le médecin <input type="checkbox"/> Suivi de la médication / soutien au client (ITL_ENREG-MED-3HP) <input type="checkbox"/> Évaluation clinique à chaque dose administrée (ITL_EVAL-CLIN-HEBDO-3HP) <input type="checkbox"/> Selon prescription médicale : <input type="checkbox"/> Faire prélèvements sanguins PRN : bilan hépatique, créat, FSC. <input type="checkbox"/> Faire β-hCG urinaire ⁶ <input type="checkbox"/> Planifier suivi clinico-radiologique selon avis médical inscrit au formulaire <i>Guide de suivi clinico-radiologique</i> (TB-ACT-ITL_GUIDE-SCR) <input type="checkbox"/> Acheminer tous ces documents complétés à la DSPu	Signature AA/ MM/ JJ

Signature du MD: _____ N° permis: _____ Date: aaaa / mm / jj