

Vaccination contre la COVID-19 au Nunavik (MAJ 2022-12-23)

Consulter le PIQ pour indications, contre-indications, précautions, calendrier d'administration et intervalles à respecter.

En tout temps, les directives contenues dans le PIQ prévalent sur ce document.

OFFRE VACCINALE DE BASE AU NUNAVIK

Offre de vaccination **minimalement une fois/semaine** (jeudis), avec ou sans RV, en plus d'une offre complémentaire périodique hors CLSC.

SAISIE AU REGISTRE VACCINAL, GESTION DES PERTES ET RAPPORT DE VACCINATION

- La saisie au registre vaccinal doit être complétée **maximalement 48hrs** suivant l'administration.
- L'inventaire physique des fioles de vaccins COVID-19 doit être effectué **minimalement 1x / semaine**.
- Toute perte de fioles **non-entamées** doivent être déclarée (Ex : délai de conservation au réfrigérateur dépassé, fiole expirée, BCF, etc.).

MANIFESTATIONS CLINIQUES INHABITUELLES

Toute MCI doit être déclarée via le formulaire AH-728 (envoyer à vanessa.drolet.ciusscn@ssss.gouv.qc.ca)

NOTES ADDITIONNELLES – CONSERVATION DES VACCINS:

- **Fioles périmées :**
 - Valider la date de péremption réelle au SiPMi avant de jeter (prolongation possible des certains lots).
 - Pour les **Comirnaty pédiatrique 5-11ans** (monovalent **et bivalent**) **ET le Comirnaty BIVALENT**: la date d'expiration se calcule en comptant 12 mois après la date de fabrication écrite sur la fiole. Valider au SiPMi avant de jeter (prolongation possible).
- Tous les diluants doivent être conservés entre 2-8°C ou à T° pièce.
- Un vaccin décongelé ne peut pas être remis au congélateur, sauf si indications contraires de la DSP.

Groupes d'âge Choix préférentiels de vaccin contre la COVID-19 selon l'âge :

→ Les vaccins présentés sont les choix à privilégier pour chaque groupe d'âge, selon le Comité en immunisation du Québec (CIQ).
 → D'autres vaccins sont autorisés selon l'âge. Consultez le PIQ pour connaître les autres options de vaccins autorisés au besoin.

6 mois à 4 ans

Spikevax 6 MOIS – 4 ANS

(0,10 mg/ml - 25µg) Capuchon bleu, Fiole multidoses de 2,5 ml



5 à 11 ans

Primovaccination :

Comirnaty pédiatrique MONOVALENT

(10µg)

capuchon orange

Fiole multidoses de 2 ml



Doses de rappel :

Comirnaty pédiatrique BIVALENT BA.4-5

(5µg/5µg)

capuchon orange + mention souche

Omicron

Fiole multidoses de 1.3ml



12 ans et plus*

Primovaccination :

Comirnaty MONOVALENT

(30µg)

capuchon gris, Fiole multidoses de 2 ml



Primovaccination

Doses de rappel / additionnelles :

Comirnaty BIVALENT

BA.4-5 (15µg/15µg)

capuchon gris + mention souche Omicron

Fiole multidoses de 2 ml



Doses de rappel

Pour les personnes de 30 ans et plus* :

Spikevax MONOVALENT

(0,20mg/ml - 50 µg)

capuchon rouge, Fiole multidoses de 5 ml



Pour les personnes de 30 ans et plus* :

Spikevax BIVALENT

(0,10 mg/ml - 25 µg/ 25 µg)

Fiole multidoses de 2,5 ml

- BA.4-5 : capuchon bleu / étiquette gris + mention souche Omicron
- BA.1 : capuchon bleu / étiquette vert + mention souche Omicron



BA.1

BA.4-5

*PRIVILÉGIER LES PRODUITS COMIRNATY POUR LES PERSONNES DE 5 à 29 ANS.

Vaccins à ARNm

PFIZER

MODERNA

	PFIZER				MODERNA		
	COMIRNATY 5-11 ans MONOVALENT 10 µg / dose Capuchon ORANGE Fiole de 2 ml (10 doses)	COMIRNATY 5-11 ans BIVALENT BA.4-5 5µg / 5µg Capuchon ORANGE- étiquette orange Fiole de 2 ml (10 doses)	COMIRNATY MONOVALENT 30 µg/ dose Capuchon GRIS Fiole de 2 ml (6 doses)	COMIRNATY BIVALENT BA.4-5 15ug /15ug Capuchon GRIS Fiole de 2ml (6 doses)	SPIKEVAX 6mois-4ans 0,10 mg/ml - 25µg Capuchon BLEU Fiole de 2,5 ml (10 doses)	SPIKEVAX MONOVALENT 0,20 mg/ml - 50µg Capuchon ROUGE Fiole de 5 ml (10 à 20 doses)	SPIKEVAX BIVALENT 0,10mg/ml- 25µg / 25µg Capuchon BLEU– étiquette VERT (BA.1) ou GRIS-étiquette GRIS (BA.4-5) Fiole de 2,5 ml (5 doses)
Posologie :	5-11 ans : Primovaccination 0,2 ml IM Dose de rappel (<i>Privilégier le produit bivalent</i>) : 0,2 ml IM	5-11 ans : Dose de rappel 0,2 ml IM	12ans et plus : Primovaccination 0,3 ml IM Dose de rappel (<i>Privilégier produit bivalent</i>) : 0,3 ml IM	12 ans et plus : Dose de rappel 0,3ml IM	6mois – 4ans : Primovaccination 0,25 ml IM	6-11 ans : Primovaccination 0,25 ml IM 12 ans et plus : Primovaccination (<i>Privilégier le Comirnaty pour les 29 ans et moins</i>) : 0,5 ml IM Dose de rappel (<i>privilégier produit bivalent</i>) : 0,25 ml IM	18 ans et plus* : Dose de rappel (<i>Privilégier le Comirnaty pour les personnes de 18 à 29ans</i>) : 0,5 ml IM
Conservation :	<ul style="list-style-type: none"> JAMAIS à -20c 2 et 8°C : 10 semaines sans dépasser la date de péremption. Fiole ouverte: ad 12 heures (2-8°C)) 				<ul style="list-style-type: none"> -25 et -15°C : ad péremption. 2 et 8°C: 30 jrs. Fiole ouverte: ad 24 heures (2-8°) 		
Dilution :	Reconstituer avec 1,3 ml de diluant fourni.		Sans dilution		Sans dilution		

Vaccin à protéine recombinante avec adjuvant

NOVAVAX (Nuvaxovid)

Fioles multidoses de 5 ml (10 doses)

Posologie :

12 ans et plus :

0,5 ml IM

Conservation :

2 et 8°C : ad péremption

Fiole ouverte: ad 6 heures (2-8°C).