

ᓀᓈᕐᓯᒪᔪᑦ

ᐆᒪᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕆᔭᐅᓲᑦ ᐃᕐᕋᕕᒃᑯᓗ

ᐋᓐᓂᐊᑖᕆᔭᐅᓲᑦ
ᖃᓄᐃᓕᕐᐱᑖ? 2017
ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᓯᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓂᖏᑦ

ᑖᓐᓇ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎ ᖃᓄᐃᓕᕐᐱᑖ ? 2017-ᒥ ᐱᓇᓱᐊ ᕐᑕᕕᓂ ᕐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᑖᕆᔭᐅᓲᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᓄ ᓇ ᕕ ᒻ ᒥ ᐅ ᕝ ᕙ ᓘ ᓐ ᓃ ᑦ ᐃ ᕐ ᕋ ᕕ ᓕᕆ ᓐ ᓇ ᑑ ᓲ ᓂ ᒃ. ᖃᓄᐃᓕᕐᐱᑖ ? 2017-ᒥ ᐸᕐᓀᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔨᒐᑦᓴᓕᐅᕐᓯᒪᓚᐅᔪᕗᑦ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᐱᑦᓱᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᑖᕆᔭᐅᓲᓂᒃ (ᖃᐅᔨᒣᓕᖓᓇᕐᑐᖅ, ᖁᒻᒥᓇᕐᑐᖅ (Trichinella sp.) ᐊᒻᒪᓗ ᖁᒻᒥᓇᕐᑐᖅ (Toxoplasma gondii)) ᒪᕐᕉᓗ ᐃᕐᕋᕕᓕᕆᓐᓇᑑᒃ (Cryptosporidium sp. and Helicobacter pylori) ᐊ ᓯ ᖏ ᓪ ᓗ ᑕ ᒪ ᒃ ᑯ ᓄ ᖓ ᐅ ᓕ ᖓ ᔪ ᑦ ( ᐆ ᒪ ᔪ ᓄ ᑦ ᑮ ᔭ ᐅ ᓃ ᑦ, ᐃ ᕐ ᕋ ᕕ ᓕ ᕆ ᓐ ᓇ ᑐ ᑦ, ᐊ ᓇ ᒃ ᑯ ᓗ ᐊ ᐅ ᑦ ᑕ ᖃ ᕐ ᓂ ᖅ) ᖃ ᐅ ᔨ ᒪ ᔭ ᐅ ᓕ ᕐ ᑐ ᑎ ᒍ ᑦ ᓄ ᓇ ᓕ ᓕ ᒫ ᓂ ᓪ ᓗ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᐅᔪᑎᒍᑦ.

ᖃᐅᔨᒣᓕᓇᕐᑐᖅ ᑐᖁᒍᑕᐅᓲᒍᑦᓱᓂ ᐋᓐᓂᐊᑖᒍᓲᒍᕗᖅ ᖁᐱᕐᕉᓱᓂ ᐁᑦᑐᑑᑕᐅᓲᖅ (Lyssavirus) ᐃᓄᒻᒧᑦ ᐁᑦᑑᑎᐅᒍᓐᓇᓲᒍᑦᓱᓂ ᑮᔭᐅᔪᖃᑐᐊᕐᒪᑦ ᐆᒪᔫᓪᓘᓃᑦ ᖁ ᕐ ᓕ ᐊ ᑕ ᖓ ᓄ ᑦ ᐊ ᑦ ᑐ ᑕ ᕕ ᓂ ᐅ ᔪ ᖃ ᕐ ᐸ ᑦ ᖃᐅᔨᒣᓕᖓᓇᕐᑐᓕᒻᒧᑦ. ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑐᓴᕐᑎᑕᐅᓯᒪᖕᖏᑐᒍᑦ ᐃᓄᒻᒥᒃ ᖃᐅᔨᒣᓕᖓᓇᕐᑐᑕᓕᒻᒥᒃ. ᖃᓄᐃᓕᕐᐱᑖ ? 2004-ᒥ ᖃ ᐅ ᔨ ᓴ ᕐ ᑕ ᐅ ᒍ ᑎ ᕕ ᓂ ᑎ ᒍ ᑦ ᑲᐱᔭᐅᒍᑎᖃᕐᓯᒪᖕᖏᑐᑦ ᐆᒪᔪᕐᓯᐅᑏᑦ ᓄᓇᒥ ᐱᓱᑦᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᑖᓚᕿᒍᓐᓇᓂᕋᕐᑕᐅᓂᕐᖁᑦ. ᑌᒣᒻᒪᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᓱᒧᑦ ᑌᒣᑦᑑᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓕᕋᑕᕐᓂᒥᔪᖅ 2017-ᒥ. ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑕᐅᕙᓪᓗᓲᒍᓂᕐᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑮᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᕿᑦᓱᑕᕕᓃᓪᓘᓃᑦ ᕿᒻᒥᓄᑦ (6%-ᖏ) ᓄᔪᐊᕐᑑᓄᑦ ᐆᒪᔪᓄᑦ ᑌᒣᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᑎᑦᓯᒍᑕᐅᖕᖏᑑᓂᕐᓴᐅᓲᒍᕗᑦ (<1%), ᕿᒻᒦᑦ ᖃᐅᔨᒣᓕᓇᕐᑐᑖᕐᓂᐅᔭᖕᖏᓂᕐᓴᐅᕗᑦ. ᐃ ᑯ ᓪ ᓚ ᑎ ᑕ ᐅ ᒐ ᓱ ᐊ ᓪ ᓚ ᕆ ᓲ ᒍ ᕗ ᖅ ᐆ ᒪ ᔪ ᓄ ᑦ

ᑮᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᒣᓕᖓᓇᕐᑐᑖᕈᒪᖕᖏᒧᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑎᒍᑦ.

ᖁᒻᒥᓇᕐᑐᖅ (Trichinella sp.) ᒥᑭᔪᒍᓘᑦᓱᓂ ᖁᒪᖅ ᓄ ᔪ ᐊ ᕐ ᑑ ᑦ ᐆ ᒪ ᔪ ᑦ ᓄ ᑭ ᖏ ᓐ ᓃ ᓲ ᒍ ᑦ ᓱ ᓂ ᐁᕕᕐᓃᓲᒍᒻᒥᓱᓂᓗ. ᐃᕐᕋᕕᓕᕆᓪᓚᕆᑦᑐᐊᓘᓐᓇᑐᖅ ᓄᑭᓕᕆᒍᑕᐅᒍᓐᓇᓱᓂᓗ. ᑎᒥᒃᑯᑦ ᓴᐴᓗᑕᓕᓐᓂᒃ ᖁᒻᒥᑌᓕᒍᑎᑦᓴᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᓗᐊᕐᓯᒪᖕᖏᓚᑦ

(3%).

ᖁᒻᒥᓇᕐᑐᖅ ( Cryptosporidium) ᖁ ᒪ ᐅ ᑦ ᓱ ᓂ ᐃ ᕐ ᕋ ᕕ ᓕ ᕆ ᔫ ᑉ ᒪ ᓗ ᓐ ᓇ ᐅ ᑎ ᖏ ᓐ ᓂ ᒃ ᒪᓗᓐᓇᐅᑎᖃᕈᑕᐅᒍᓐᓇᓱᓂ ᑲᒃᑲᓛᓄᑦ ᐱᐊᕋᕐᓄᑦ ᑎᒥᒃᑯᓗ ᓴᐴᓗᑕᖃᑦᓯᐊᖏᑦᑐᓄᑦ ᐃᓄᑐᖃᐅᓂᕐᓴᓄᓪᓗ. ᑐᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᕐᐱᑖ ? 2 0 1 7 - ᒥ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᕕᓃᑦ ᐊᐅᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒍᑎᕕᓂᖏᑦ

ᐱ ᑕᖃ ᓪ ᓗ ᐊ ᓂᕃ ᓐ ᓂ ᖕᖏ ᑐ ᑦ ( 6 %). ᓯᕗ ᓪ ᓕ ᐹ ᖅ
ᐊᓪᓚᖁᑎᓃᑦᓱᓂ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᖁᒻᒥᕈᑕᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒍ

( cryptosporidiosis) ᓄᓇᕕ ᒻᒥ 2013-2014-ᒥ ᖁᒻᒥᓇᕐᑐᒧᑦ (Cryptosporidium hominis).

ᖁᒻᒥᓇᕐᑐᖅ Toxoplasma gondii ᖁᒪᖅ ᐊᑦᑕᓇᕐᑑᕗᖅ
ᐱᐊᕋᑦᓴᓕᒃ ᐁᑦᑐᐃᑐᐊᕐᒪᑦ ᕿᑐᕐᖓᓴᒥᓂᒃ ᑎᒥᒃᑯᓗ

ᓴᐴᓗᑕᖃ ᑦᓯᐊᖏ ᑦᑐ ᑦ ᐁ ᑦᑐᑕᐅᑐᐊ ᕐᒪᑕ. ᑎᒥ ᒃᑯ ᑦ ᓴᐴᓗᑕᖃᑦᓯᐊᒋᓐᓂᓴᕕᓂᐅᕗᑦ ᖁᒻᒥᓇᕐᑐᒥᒃ T. gondii ᐋᓐᓂᐊᑖᕐᑌᓕᒍᑎᑦᓴᒥᒃ 2004-ᓗ (60%) 2017-ᓗ (42%) ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ, ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᐅᓯᑦᓱᓂ ᖁᒻᒥᓇᕐᑐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᑖᕈᓇᐅᖕᖏᓂᕐᓴᐅᓕᕐᓂᒥᒃ.

ᖃᓄᐃᓕᕐᐱᑖ? 2017 ᐃᓄᖁᑎᖏᑦᑕ ᐃᓗᓯᖏᓐᓂᑦ
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕕᓂᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᐅᒡᒍᓯᒥᑦ ᐅᑦᑐᐱᕆᒧᑦ
2017ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᑲᑎᑦᓱᑎᑦ 1 326 ᐃᓚᐅᓐᓂᖁᑦ
ᐅᑭᐅᓖᑦ 16ᓂᑦ ᐊᖓᔪᑦᓰᓗ 14ᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ
ᐃᑲᔪᕐᓯᓂᕐᖁᑦ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ.

ᓇᑯᕐᒦᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔪᕕᓃᑦ ᑕᒪᑦᓱᒥᖓ ᐱᒻᒪᕆᒻᒥᒃ ᐃᓗᓯᕐᒧᓕᖓᔪᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕕᓂᕐᒥᒃ!

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᖅ : www.nrbhss.ca

Arctic. ᖁᐱᕐᕈᖅ ( Helicobacter pylori)
ᐅᓄᕐᓯᕙᓪᓕᐊᓲᒍᕗᖅ ᐊᕿᐊᕉᑉ ᑲᕕᕈᖓᓂ ᐃᓇᓗᐊᓂᓪᓗ ᐃᓚᖓᒍᑦ. ᐳᓪᓕᓚᖀᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᐅᐸᕐᓰᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐋ ᓐ ᓂ ᓇ ᕐ ᑑ ᓗ ᓂ ᓗ, ᑲ ᓚ ᐅ ᔭ ᕈ ᑕ ᐅ ᓗ ᓂ ᓘ ᓐ ᓃ ᑦ
ᐊᓯᖏᑎᒍᓪᓘᓃᑦ ᐃᓱᕐᕆᒍᓐᓀᕈᑕᐅᓗᓂ. ᖁᐱᕐᕈᒥᒃ (H. pylori) ᐁᑦᑐᑕᐅᓯᒪᔪᕕᓃᑦ (ᐊᓇᖏᓐᓃᑐᓂᒃ) 70%ᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ. ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐳᓴᓐᑎᑎᒍᑦ ᐊᒥᓱᕕᓂᒻᒪᕆᐅᕗᑦ ᑎᒥᒻᒥᒍᑦ ᓴᐴᓗᑕᓖᑦ ᐋᓐᓂᐊᑖᕇᒃᑯᑎᑦᓴᒥᒃ ᖁᐱᕐᕈᒧᑦ (H. pylori) ᑌᒣᓪᓗᐊᓭᓐᓇᑐᕕᓂᐅ ᑦᓱᑎᓪᓗ 2004 ᑎᑭᕋᑕ ᕐᓱᒍ ᑌᒣᕙᓪᓗᑐᐃᓐᓇᒥ ᑦᓱᑎᓪᓗ ᐊᓯᖏ ᑦ ᓄᓇᓕᑐᙯᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥᐅᑦ.

2017-ᒥ, ᐃᕐᕋᕕᓕᕆᓂᕋᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ 30 ᐅᓪᓗᐃᑦ ᒥᑦᓯᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᓚᐅᕐᑎᓇᒍ 12% ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ, 2004-ᒥ ᑌᒣᑦᑐᓭᓐᓇᕙᓪᓗᕕᓃᑦ (10%). ᐅᓪᓗᓂ 1.4-ᓂ ᐊᑯᓃ ᕐᑐᒥ ᒃ ᐃ ᕐᕋᕕᓕᕆᓂᕋ ᕐᓯᒪᕙᓪᓗᑐᕕᓃ ᑦ ᐊᑯᓃ ᕐᓂᓭᑦ ᐅᓪᓗᓂ ᐱᖓᓱᓂ ᐅᓄ ᕐᓂᓴᓂᓪᓘᓃ ᐃ ᕐ ᕋ ᕕ ᓕ ᕆ ᓂ ᕋ ᕐ ᓯ ᒪ ᑎ ᓪ ᓗ ᒋ ᑦ 3 5 % - ᖏ ᑦ ᐃᕐᕋᕕᓕᕆᓂᕋᕐᓯᒪᔪᑦ.

ᖃᐅᔨᓴ ᕐᓃ ᑦ ᖃᐅᔨᒍᑕᐅᓯᒪᓂᖏ ᑦ ᑕ ᑉᐱᑯᐊ

ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᒻᒥᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑖᓐᓇ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎ ᑐᑭᓯᒍᑎᐅᒋᕗᖅ ᐊᑦᑕᓇᕐᓯᒍᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᓴ ᐳ ᑦ ᔨ ᒍ ᑎ ᐅ ᒋ ᐊ ᓕ ᓐ ᓂ ᓗ ᖃᐅᔨᒍᑕᐅᓯᒪᔪᓅᓕᖓᔪᓂᒃ. ᓱᕐᖁᐃᓯᑦᓯᐊᕈᑎᑦᓭᑦ ᐊ ᑦ ᔨ ᒌ ᖕ ᖏ ᑐ ᓂ ᒃ ᕿ ᒥ ᕐ ᕈ ᕈ ᑕ ᐅ ᓯ ᒪ ᔪ ᓂ ᑦ ᐱᔭᐅᒋᐊᖃᕋᔭ ᕐᖁ ᑦ ᓇᓗᓀ ᕐᓯᒍᑎ ᑦᓴᐅᓗᑎ ᒃ ᓇ ᓪ ᓕ ᖏ ᑦ ᐱ ᑦ ᔪ ᑕ ᐅ ᔪ ᑦ

ᖃᐅᔨᒍᑕᐅᓯᒪᔪᓅᓕᖓᒻᒪᖔᑕ.